

EMANSIL

Grupo

Insecticida agrícola

No de Registro: 150-18/NA



EMANSIL.-

Insecticida con acción de contacto y estomacal del grupo de las avermectina, que contiene 50 gramos de ingrediente activo por cada Kilo de producto comercial. Formulado como Granulos Dispersables (WG), posee limitada actividad sistémica pero excelente actividad tras laminar, provocando la muerte de las larvas de lepidopteros por inanición en un lapso de 2 a 4 días.

Composición.

Formulación: Gránulos Dispersables (WG)

Olor:

Solubilidad: Totalmente soluble en agua

Composición garantizada:

Emamectin benzoate	50 g/kg
Nonyl Phenol Polyethylene Glycol Polypropylene	80 g/kg
Excipientes	c.s.p 1 kg

Modo de acción

EMANSIL.- Actúa como un insecticida inhibidor del sistema neurotransmisor que causa la parálisis de las larvas post ingesta de tejido contaminado o directamente al contacto con la molécula Emamectin benzoate.

Aplicación

EMANSIL.- Puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre sea manual o mecánico, asegurándose siempre de utilizar volúmenes superiores a los 200 L de agua por Ha.

Modo de empleo. Dosis.

Llenar hasta la mitad el tanque de pulverización, agregar el producto y terminar el llenado, siempre con el sistema de agitación en funcionamiento.

Cultivo	Plaga	Dosis	PC (Período de Carencia)
Maíz (<i>Zea mays</i>)	Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	0.20 Kg/ha	Maíz 3 días

Compatibilidad

EMANSIL.- No se puede utilizar en mezclas con ácidos fuertes o álcalis fuertes.

Fitotoxicidad

Categoría toxicológica III
Franja Azul, Ligeramente peligroso

Presentación

Funda de aluminio de 150 gr.

Almacenaje y manipulación

Guárdese en un sitio limpio, fresco y seco, fuera de la luz directa. Se evitarán oscilaciones extremas de temperatura durante su almacenaje. Agítese antes de usar.

Observaciones

Para más detalles sobre **EMANSIL** visite nuestro sitio web: www.nederagro.com o contáctese con nuestro servicio al cliente PBX: 042 113133 - email: ventas@nederagro.com
Guayaquil - Ecuador.